

Dose Augmentin Bustine 400/57 mg

Augmentin è un antibiotico ad ampio spettro a base di Amoxicillina e Acido Clavulanico che può risultare efficace in numerose tipologie di infezioni

In questo breve estratto vediamo solo il dosaggio. Per capire a che serve e approfondire vi consigliamo di leggere anche:

- [Augmentin ® Amoxicillina - Acido Clavulanico](#)

Dosaggio

Il dosaggio può variare non solo in base al peso del paziente ma anche in base al tipo di infezione:

- Dose minima di 50 mg/Kg/die utile nella comune faringotonsillite
- Dose massima di 90 mg/Kg/die in casi di polmonite, di otite o sinusite acuta.

La dose massima giornaliera non dovrebbe superare in ogni caso i 3000 mg (cioè 3 grammi)



CERCHI UN
**PEDIATRA
A CASA?**

Elenco Medici

Seleziona uno o più medici e attendi il primo che risponderà

SELEZIONA TUTTI

- Dott. Iva Trevisano
Disponibile
- Dott. Domenico Arcuri
Disponibile
- Dott. Maria Pia Panicucci
Non Disponibile
- Dott. Gaetano Padovano
Disponibile
- Dott. Marzio Calabresi
Disponibile
- Dott. Sebastiano Cremonesi
Non Disponibile

SCARICA L'APP

faro PEDIATRICO

Download on the App Store

DISPONIBILE SU Google Play

AUGMENTIN BUSTINE 400/57 mg - Aroma di pesca-limone-fragola.

Avete già letto come usare l'[augmentin sospensione](#)? Perfetto. Adesso ricordate solo che ogni bustina da 400mg/57mg equivale a 5 ml di sciroppo. Tutto qui.

Es: Bimbo che pesa 15 Kg... quanto sciroppo daresti? $15 \text{ Kg} : 3 = 5 \text{ ml di sciroppo che equivale ad 1 bustina}$. Dando tale bustina ogni 12 ore otterrò la dose minima. Dandola ogni 8 ore otterrò invece la dose massima.

Le bustine vanno sciolte in mezzo bicchiere d'acqua mescolando bene prima dell'assunzione.

