

## Dose Augmentin Bustine 400/57 mg

Augmentin è un antibiotico ad ampio spettro a base di Amoxicillina e Acido Clavulanico che può risultare efficace in numerose tipologie di infezioni

In questo breve estratto vediamo solo il dosaggio. Per capire a che serve e approfondire vi consigliamo di leggere anche:

- [Augmentin ® Amoxicillina - Acido Clavulanico](#)

### Dosaggio

Il dosaggio può variare non solo in base al peso del paziente ma anche in base al tipo di infezione:

- Dose minima di 50 mg/Kg/die utile nella comune faringotonsillite
- Dose massima di 90 mg/Kg/die in casi di polmonite, di otite o sinusite acuta.

La dose massima giornaliera non dovrebbe superare in ogni caso i 3000 mg (cioè 3 grammi)

AUGMENTIN BUSTINE 400/57 mg - Aroma di pesca-limone-fragola.

Avete già letto come usare l'[augmentin sospensione](#)? Perfetto. Adesso ricordate solo che ogni bustina da 400mg/57mg equivale a 5 ml di sciroppo. Tutto qui.

*Es: Bimbo che pesa 15 Kg... quanto sciroppo daresti?  $15 \text{ Kg} : 3 = 5 \text{ ml di sciroppo che equivale ad 1 bustina}$ . Dando tale bustina ogni 12 ore otterrò la dose minima. Dandola ogni 8 ore otterrò invece la dose massima.*

Le bustine vanno sciolte in mezzo bicchiere d'acqua mescolando bene prima dell'assunzione.

*Febbre alta dopo appena 2 ore dall'ultima dose di antifebbre?*

*Ascolta la telefonata del dottor Troiano con una mamma col bimbo con febbre alta nel video qui sotto linkato! Segui il [ilPediatraSpiega](#) su Youtube!*