

Tralasciando le ragioni religioso-culturali, vi sono diverse situazioni cliniche in cui risulta utile procedere alla CIRCONCISIONE del prepuzio in bambini e adolescenti. Vediamo quali.



CERCHI UN  
**PEDIATRA  
A CASA?**

11:29  
Elenco Medici  
Seleziona uno o più medici e attendi il primo che risponderà  
SELEZIONA TUTTI

- Dott. Iva Trevisano  
Disponibile
- Dott. Domenico Arcuri  
Disponibile
- Dott. Maria Pia Panicucci  
Non Disponibile
- Dott. Gaetano Padovano  
Disponibile
- Dott. Marzio Calabresi  
Disponibile
- Dott. Sebastiano Cremonesi  
Non Disponibile

SCARICA L'APP

  

**BAMBINI**

- Fimosi Patologica *cioè con anello fibrotico*
- Fimosi Fisiologica associata a infezioni delle vie urinarie ricorrenti
- Balanopostiti ricorrenti

**ADOLESCENTI E ADULTI**

- Fimosi Patologica
- Fimosi Fisiologica associata ad erezioni dolorose e difficoltà all'atto sessuale *ricordando che la fimosi fisiologica come sopra spiegato permane solo nell'1% dei casi dopo la pubertà*

Per saperne di più sulla fimosi ritorna a: [Pisellino che non si apre! Igiene, Aderenze, Fimosi](#)

Pathologic and physiologic phimosis, Approach to the phimotic foreskin  
Thomas B. McGregor MD John G. Pike MD FRCSC Michael P. Leonard MD FRCSC FAAP