

COME UTILIZZARE ZOFRAN

Il dosaggio dell'ondansetron è 0,15 mg/kg dose e può essere dato per via orale, sublinguale o intramuscolo:

- 2 mg dagli 8 ai 15 kg
- 4 mg dai 15 ai 30 kg
- 6 mg dai 30 ai 60 kg
- 8 mg dai 60 Kg in poi

Ricorda che il formato sciroppo contiene 4 mg/5 ml, quindi:

- 2,5 ml (ovvero 2 mg) dagli 8 ai 15 kg
- 5 ml (ovvero 4 mg) dai 15 ai 30 kg
- 7,5 ml (ovvero 6 mg) dai 30 ai 60 kg
- 10 ml (ovvero 8 mg) dai 60 Kg in poi

In caso di gastroenterite è sufficiente un'unica dose (terapia one-shot), senza proseguire la terapia nei giorni successivi.

A distanza di mezzora circa dall'assunzione di zofran si inizierà l'ultimo tentativo di [reidratazione orale del bambino](#).

CAUTELE PRE-ZOFRAN

L'ondansetron rientra tra i farmaci potenzialmente aritmogeni per i pazienti con QT lungo. Laddove si voglia essere molto zelanti e cautelarsi al massimo, prima di utilizzarlo, conviene di:

- Fare un ECG per verificare QT laddove possibile
- Evitare di utilizzarlo in stati di disidratazione moderato-severa (la possibile ipokaliemia associata potrebbe allungare il QT)

